Ventajas y limitaciones del diagnóstico no invasivo de fibrosis en el NAFLD

Mercedes Rodriguez Gazari

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La **fibrosis avanzada** aumenta la morbi-mortalidad, modifica el manejo del paciente con el posible inicio de screening de HCC y considerando tratamiento (incluso clinical trials)

Prevalencia

- Fibrosis avanzada F3: 24%
- Cirrosis: 9%

EVALUACIÓN

BIOPSIA

- **Gold standard**
- Invasiva
- Complicaciones
- Error de muestreo
- Costo

TEST NO INVASIVOS

- Identifica bajo riesgo
- Monitoreo de progresión
- Evaluar respuestas terapéuticas
- Disminuye número de biopsias

DIGNÓSTICOS NO INVASIVOS DE FIBROSIS

Sérológicos

FIB-4

NAFLD Fibrosis Score

BARD

APRI

ELF

FIBROSpect

HEPAScore

FIBROTEST

Físicos

ELASTOGRAFÍA – FIBROSCAN

ELASTOGRAFÍA POR RM

ELASTOGRAFÍA DE ONDA DE CORTE

ARFI

Métodos mejor validados en poblaciones con NAFLD

SCORES SEROLÓGICOS PARA FIBROSIS

Fibrosis 4 Score

AST-GOT (U/L) ALT-GPT (U/L)

Plaquetas(mm3) Edad (años)

Calcular **Borrar**

FIB-4

NAFLD fibrosis score

Higado graso no alcohólico / determinación del grado de fibrosis

DM/IFG* Edad(años)

PESO Kg TALLA(cm)

AST-GOT (U/L) ALT-GPT (U/L)

Plaquetas($10^9/l$) Albumina g/L

Calcular **Borrar**

SCORES SEROLÓGICOS PARA FIBROSIS

SCORES SEROLÓGICOS PARA FIBROSIS

- FIB-4 y NFS tiene un **alto VPN (>90%)** para descartar fibrosis avanzada.
- Sirven para **identificar pacientes sin fibrosis**
- FIB-4 evalúa parámetros más simples que el NFS

LIMITACIONES:

1. La capacidad para confirmar fibrosis avanzada es inadecuada (**VPP ~60%**). Es necesaria la evaluación con **otros estudios**.
2. Una gran proporción de pacientes cae en una **categoría intermedia** y no puede ser correctamente clasificada.

MÉTODOS FÍSICOS

Elastografía de transición (FibroScan)

- Más estudiado. Menos precisa para estadios intermedios. El uso de sonda XL reduce el porcentaje de fallos en pacientes con IMC > 30 y/o un pliegue torácico aumentado.

ARFI (Impulso por imagen de fuerza de radiación acústica)

- US. Útil para fibrosis avanzada. En NAFLD, la tasa de falla es del 5%, pero suben a 28% en pacientes con IMC > 30

Elastografía por onda de corte

- US. El porcentaje de falla técnica y la tasa de resultados similares al FibroScan®

Elastografía por RM

- Mayor eficacia diagnóstica que los anteriores fibrosis hepática avanzada (AUROC 0,92-0,94), con una tasa de falla técnica del 7,7%. Su accesibilidad es limitada.

Elastografía de transición Fibroscan

- ✓ Técnica **rápida, reproducible** y con escasa variabilidad interoperador
- ✓ Emite una **onda vibratoria** y mide por US la velocidad de transmisión
- ✓ NAFLD: ≥ 9.9 kPa tiene S 95% / E 77% para **diagnosticar fibrosis avanzada**
- ✓ **Tasa de falla:** 3% - 27% con sonda M (> pacientes con IMC alto). Con sonda XL la tasas de fallas menores al 10%.

Parámetro de Atenuación Controlada (CAP)

- **Cuantificación de esteatosis** expresado en dB/m con un rango que va de 100 a 400 dB/m.
- Resultado óptimo: 10 mediciones válidas y un valor de **IQR** menor a 30%
- **Alta precisión** diagnóstica - AUROC 0,82

Sonda M y XL

Fibroscan y CAP

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE HÍGADO GRASO (ESTEATOSIS)

Intervalo	Grado de esteatosis o grasa	Interpretación
<232 dB	0	-5% de las células hepáticas, con contenido graso
232-256 dB	1	5 - 32% de las células hepáticas, con contenido graso
257-290 dB	2	33 - 65% de las células hepáticas, con contenido graso
290-326 dB	3	+66% de las células hepáticas, con contenido graso

Fibroscan y CAP

CAP para esteatosis (S $\geq$ 1):
> AUC = 0.87 (0.82-0.92)

FS fibrosis avanzada (F $\geq$ 3):
> AUC = 0.80 (0.75-0.84)

FS para cirrhosis (F=4):
> AUC = 0.89 (0.84-0.93)

FS menor precisión en F2.

El grado de esteatosis no afectó el registro de fibrosis

FibroScan vs. ARFI

Los 3 métodos físicos demostraron fuerte correlación con el estadio histológico

- Falla del método
- Resultados no confiables
- Resultados confiables

ARFI falló significativamente más que FS
Relación con IMC-cintura-pared

RMN vs Fibroscan

RMN AUROC 0.82 – FS AUROC 0.67 . $P=0.01$

Precisión diagnóstica entre RMN vs FS para diagnósticos dicotomizados de estadios de fibrosis y grados de esteatosis

FIB-4 + FIBROSCAN

Implementación de un modelo teórico de detección de pacientes de riesgo en atención primaria

Asociación entre FIB-4 y elastografía

Un FIB-4 $\leq$ 1.3 fue asociado al 12% de posibilidades de encontrar una elastografía $>$ 8 kPa
Diabetes, edad e IMC tienen impacto moderado en esta asociación FIB-4/FS
Un FIB-4 $\leq$ 1.3 fue aceptable para excluir fibrosis avanzada evaluado por elastografía

1

Evaluación en primera línea de atención

2 Progresar en la evaluación

Ventajas y limitaciones de los test no invasivos

- ✓ Evita biopsia en muchos pacientes
- ✓ Permite monitoreo
- ✓ Baja costos
- ✓ Accesible
- ✓ Se puede combinar los test

- ❖ No confirma fibrosis avanzada
- ❖ Solo identifica bajo riesgo (F0-F1)
- ❖ Métodos físicos: dificultades técnicas y en autorizaciones
- ❖ No otorga más datos sobre la patología

Muchas gracias.